

**သတိပြုလိုက်နာရန်**

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်းတို့ကိုအစမပြုပါနှင့်။

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေရုံသာမက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်စေသဖြင့်လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ။

နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် ဆောလျင်စွာပြသ၍ စနစ်တကျကုသမှုခံယူပါ။

ကလေးငယ်များအနီးတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များအား ဆေးလိပ်မီးညှိခိုင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကလေးများတွင် မကောင်းသည့်အမူအကျင့်များ ကူးစက်နိုင်ပါသည်။

သင့်နှင့်သင့်မိသားစု ရောဂါဘယကင်းဝေးစေရန် ဆေးလိပ်၊ စီးကရက် အမျိုးမျိုးနှင့် ကွမ်းယာစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။



**ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက် ကင်းစင်မှု ရောဂါဘယ ကင်းဝေးရ**



**Towards Tobacco Free Myanmar**

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊  
ကျန်းမာရေးပညာဌာနခွဲနှင့်  
မကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲတို့  
ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေသည်။

(၂၀၁၇၊ မေလ)



# ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး အန္တရာယ်

- ☞ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့တွင် ကတ္တရာ၊ ကာဗွန်မိုနော့ဆိုဒ်၊ ဘင်ဇင်း၊ အမိုးနီးယား အပါအဝင် ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သော ဓါတ်ပစ္စည်း (၄၀၀၀) ကျော်ပါဝင်ပါသည်။
- ☞ ဆေးရွက်ကြီးတွင် ပါဝင်သော နီကိုတင်းသည် စွဲလမ်းစေသော အာနိသင်ရှိသည်။
- ☞ ၎င်းအာနိသင်ကြောင့် စတင် စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း ပို၍ စွဲလမ်းလာပြီး ဆေးလိပ်မသောက်ရမနေနိုင်အောင်၊ ကွမ်းမစားရ၊ ဆေးမငုံရ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာကြပါသည်။


# ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ

- ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရခြင်းနှင့် ဆေးပါသောကွမ်းစားခြင်းတို့ကြောင့် -
- ခံတွင်းကင်ဆာ
  - လည်ချောင်းကင်ဆာ
  - အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုး
  - နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း
  - သွေးကြောပိတ်ခြင်း
  - ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်၍လေဖြတ်ခြင်း
  - အဆုတ်ပွရောဂါ
  - ပြင်းထန်သည်သွေးတိုးရောဂါ
  - ခြေပုပ်၊ လက်ပုပ်ရောဂါ စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

# အဆိုပါရောဂါများအပြင် -

- အမျိုးသားများတွင် -
- အသက်ရှူမဝခြင်း
  - ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုးရောဂါရခြင်း
  - အိမ်ထောင်ရေးသုခအပြည့်အဝ မခံစားနိုင်ခြင်း။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးများဆေးလိပ်သောက်လျှင် - သူတစ်ပါးဆေးလိပ်ငွေ့ရှူရလျှင် -



- ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း
- ကလေးအသေမွေးခြင်း
- လမစေ့၊ ပေါင်မပြည့်သောကလေးမွေးဖွားခြင်း
- မွေးရာပါကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းသည့် ကလေး မွေးဖွားခြင်း
- မွေးစကလေး ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။

ကွမ်းထဲတွင် ဆေးထည့်စားခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးငုံခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့ကြောင့် လူတို့၏ အသက်ကို သေစေနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။



ခံတွင်းကင်ဆာ                      လည်ချောင်းကင်ဆာ



ခြေပုပ်လက်ပုပ်ရောဂါ                      အဆုတ်ကင်ဆာ

ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့များသည် မွေးကင်းစကလေးများနှင့် လသားကလေးငယ်များတွင် -

- အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ
- ရင်ကျပ်ပန်းနာရောဂါနှင့်
- နားပြည်ယိုခြင်း မကြာခင် ဖြစ်တတ်သည်။

