

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်းတို့ကိုအစမပြုပါနှင့်။

ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေရုံသာမက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်စေသဖြင့်လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ။

နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် ဆောလျင်စွာ ပြသ၍ စနစ်တကျကုသမှုခံယူပါ။

ကလေးငယ်များအနီးတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များအား ဆေးလိပ်မီးညှိခိုင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကလေးများတွင် မကောင်းသည့်အမူအကျင့်များ ကူးစက်နိုင်ပါသည်။

သင့်နှင့်သင့်မိသားစု ရောဂါဘယကင်းဝေးစေရန် ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်အမျိုးမျိုးနှင့် ကွမ်းယာစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။



**ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက် ကင်းစင်မှု  
ရောဂါဘယ ကင်းဝေးရ**



**Towards Tobacco Free Myanmar**



ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊  
ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲနှင့်  
မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲတို့  
ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေသည်။

(၂၀၂၂-ခုနှစ်)

# ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး အန္တရာယ်

- ☞ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့တွင် ကတ္တရာ၊ ကာဗွန်မိုနော့ဆိုဒ်၊ ဘင်ဇင်၊ အမိုးနီးယား အပါအဝင် ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သော ဓါတ်ပစ္စည်း (၄၀၀၀) ကျော် ပါဝင်ပါသည်။
- ☞ ဆေးရွက်ကြီးတွင် ပါဝင်သော နီကိုတင်းသည် စွဲလမ်းစေသော အာနိသင်ရှိသည်။
- ☞ ၎င်းအာနိသင်ကြောင့် စတင် စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း ပို၍ စွဲလမ်းလာပြီး ဆေးလိပ်မသောက်ရမနေနိုင်အောင်၊ ကွမ်းမစားရ၊ ဆေးမငံ့ရမနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာကြပါသည်။

ကွမ်းထဲတွင် ဆေးထည့်စားခြင်း၊  
 ဆေးရွက်ကြီးငုံခြင်းနှင့်  
 ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့ကြောင့်  
 လူတို့၏အသက်ကို သေစေနိုင်သည်အထိ  
 အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

# ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ

ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှူရှိုက်ရခြင်းနှင့် ဆေးပါသောကွမ်းစားခြင်းတို့ကြောင့် -


- ခံတွင်းကင်ဆာ
- လည်ချောင်းကင်ဆာ
- အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာရောဂါမျိုးမျိုး
- နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း
- သွေးကြောပိတ်ခြင်း
- ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်၍လေဖြတ်ခြင်း
- အဆုတ်ပွရောဂါ
- ပြင်းထန်သည့်သွေးတိုးရောဂါ
- ခြေပုပ်၊ လက်ပုပ်ရောဂါ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



# အဆိုပါရောဂါများအပြင် -

- အမျိုးသားများတွင် - အသက်ရှူမဝခြင်း
- ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုးရောဂါရခြင်း
  - အိမ်ထောင်ရေးသုခအပြည့်အဝမခံစားနိုင်ခြင်း။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးများ ဆေးလိပ်သောက်လျှင်- သူတစ်ပါးဆေးလိပ်ငွေ့ရှူရလျှင်-



- ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း
- ကလေးအသေမွေးခြင်း
- လမစေ့၊ ပေါင်မပြည့်သောကလေးမွေးဖွားခြင်း
- မွေးရာပါကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းသည့်ကလေးမွေးဖွားခြင်း
- မွေးစကလေး ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။

ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့များသည် မွေးကင်းစကလေးများနှင့် လသားကလေးငယ်များတွင်-

- အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ
- ရင်ကြပ်ပန်းနာရောဂါနှင့်
- နားပြည်ယိုခြင်း မကြာခဏဖြစ်တတ်သည်။

