



“ သွေးလွန်တုပ်ကွေးတိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေး ”



သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသည်

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားသောရောဂါဖြစ်သည်။

ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသောခြင်ကျားအကိုက်ခံရခြင်းကြောင့် ကူးစက်သည်။



ပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာများ

၁။ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း (သို့) အလွန်မိုန်းလာခြင်း

၄။ ကော်ဖီအနစ်ရောင်အန်ခြင်း

၂။ ခြေဖျားလက်ဖျားများ အလွန်အမင်းအေးစက်ခြင်း

၅။ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း

၃။ ရှုတ်တရက်ဗိုက်အောင့်လာခြင်း

၆။ ကတ္တရာစေးကဲ့သို့ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း

အထက်ပါလက္ခဏာများအနက် တစ်ခုခု ဖြစ်ပွားလာပါကနီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။


ခြင်မကိုက်အောင်ကာကွယ်ပါ



- ▶ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်များဝတ်ဆင်ပါ။
- ▶ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ခြင်ထောင်ဖြင့်အိပ်ပါ။ (ဖြစ်နိုင်လျှင် ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်ဖြင့်အိပ်ပါ။)
- ▶ ခြင်မကိုက်လိမ်းဆေးကို အသုံးပြုပါ။

ပိုးလောက်လန်းနှိမ်နင်းပါ

- ▶ ရေစည်ရေအိုးများကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။
- ▶ ညောင်ရေအိုး၊ ပန်းအိုးများ၏ အတွင်းပိုင်းကို နေ့စဉ်ဆေးကြော၍ ရေလဲပါ။
- ▶ ရေတင်ကျန်နိုင်သည့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းအားလုံးကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။
- ▶ အုတ်ကန်၊ ရေစည်၊ ရေကန်များတွင် ပိုးလောက်လန်းစားငါး (ဒေါင်းငါး၊ ငါးထိပ်ကွက် စသည်) ထည့်ပါ။ (သို့) အဘိတ်ဆေးခတ်ပါ။



မိမိတို့အိမ်တိုင်း၊ ရွာတိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် ပိုးလောက်လန်းကင်းစင်အောင် နှိမ်နင်းကြပါစို့။

ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးဌာနနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးစီမံချက်တို့ ပူးပေါင်းပြုစုသည်။
(မေလ၊ ၂၀၁၉)

