

မက်သာနိုးဆေးအစားထိုးကုသခြင်း အစီအစဉ်



မက်သာဒုံး (Methadone) ဆေးရည် သောက်သုံးသူများအတွက်

နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း (၁)

၁။ မက်သာဒုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။

မက်သာဒုံးဆိုတာဘာလဲ။

- ❖ မက်သာဒုံးသည် သဘာဝမဟုတ်သော ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးထားသော ဘိန်းဖြူအစားထိုး ဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
- ❖ ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် အကြောထဲထိုးသွင်းရသည့် အရာမဟုတ်ပါ။
- ❖ ဘိန်းဖြူစွဲနေသောသူများကို ကုသရာ၌ ဘိန်းအစားထိုး အသုံးပြုရသော ဆေးဝါးဖြစ်သည်။
- ❖ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဆေးကုဌာန၌ တရားဝင်တိုက်ကျွေးခွင့်ရသော ဆေးဝါးဖြစ်သည်။
- ❖ ဤဆေးဝါးသည် အခြားမူးယစ်ဆေးများဖြစ်သော ဆေးခြောက်၊ ဒိုင်ယာဇီပင်၊ အမ်ဖက်တမင်း (သို့) အရက် စသည်တို့ကို စွဲနေသည့်သူများကို ကုသရာ၌ အသုံးပြုရသည့် ဆေးဝါးမဟုတ်ပါ။
- ❖ မက်သာဒုံးအစီအစဉ်သည် မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူများကို တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုနေကြခြင်းမှ လွတ်မြောက်အောင် လမ်းစရာဖွေပေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ထိုသူများကို ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။



၂။ **ဘိန်းပါဝင်သောဆေးများကိုစွဲလန်းခြင်း**

- ❖ ဘိန်းနှင့်အလားတူ ဆေးဝါး ဆိုသည်မှာ ဘိန်းမှထုတ်လုပ်ရရှိသည့် အရာများဖြစ်သည့် သဘာဝ ဘိန်းမဲ၊ ဘိန်းဖြူ၊ မော်ဖင်း၊ ကိုဒင်းနှင့် နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော မက်သာဒုံးတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ❖ ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းမဲစွဲနေသော သူများသည် ၎င်းတို့၏ ဘိန်းသုံးစွဲမှုကို အပြီးအပိုင် စွန့်လွှတ်ရန် အလွန်ခက်ခဲလေ့ရှိပါသည်။
- ❖ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလန်းခြင်း
 - ဆေးပြတ်လပ် (လိုအပ်)၍ ယင်းထလာသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လက္ခဏာသွင်ပြင်များ
 - (က) နှာရည်ယိုခြင်း၊ သမ်းဝေခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း။
 - (ခ) မူးဝေအော့အန်ခြင်း၊ ပါးစပ်ပျက်ခြင်း။
 - (ဂ) ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာခြင်း။
 - (ဃ) အဆစ်အမြစ်များကိုက်ခဲခြင်း။
 - (င) ဂနာမငြိမ်ခြင်းဖြစ်ခြင်း။
 - (စ) ချွေးထွက်များခြင်း
 - (ဆ) အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း
 - (ဇ) ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်များကိုက်ခဲခြင်း။
- ❖ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလန်းခြင်း
 - ဆေးဝါးကိုလိုချင်တောင့်တမှုရှိခြင်း၊ အာသီသပြင်းထန်လာခြင်း။



၃။ မက်သာခုံး၏ အာနိသင်နှင့် ကောင်းကျိုးများ

- ❖ ဘိန်းနှင့် အာနိသင်တူညီခြင်းကြောင့်
 - ဘိန်းအစားထိုး ဆေးဝါးအား အသုံးပြုနေသော ဝေဒနာရှင်လူနာများ၌ ဆေးဝါးပြတ်လပ်မှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ပပျောက်ခြင်းနှင့် အတူ ဆေးကို တောင့်တနေသည့် စိတ်ဆန္ဒကိုလည်း လျော့နည်းသက်သာစေသည်။
- ❖ မျိုချရသည့် ဆေးအရည်ဖြစ်ခြင်း
 - ဆေးထိုးအပ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော (ပြည်တည်အကြိတ်နာနှင့် HIV ပိုးကူးစက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များ၊ အသည်းရောင်၊ အသားဝါဘီပိုး၊ စိပိုးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အနံ့နှင့် ဆေးထိုးထားသောနေရာတွင်ဖြစ်သော ပြည်တည်ကူးစက်ရောဂါများစသည့်) အန္တရာယ်များကို လျော့နည်းသက်သာစေသည်။
- ❖ တာရှည်ခံခြင်း (၂၄ မှ ၃၆ နာရီကြာအောင်) ကြောင့် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုရသဖြင့် အခြားအလုပ်လုပ်ရန် အချိန်ပိုမိုရရှိစေခြင်း။
- ❖ တရားဝင်ခြင်း။
- ❖ လမ်းပေါ်မှဝယ်ယူရသော မသန်ရှင်းသည့် ဆေးဝါးများကို အသုံးပြုခြင်းမျိုးမှ လွတ်ကင်းစေရုံသာမက အဖမ်းအဆီးခံရခြင်းနှင့် ချုပ်နှောင်ခံရခြင်း အန္တရာယ်မှလည်း လွတ်ကင်းစေသည်။

၄။ မက်သာခုံးဆေးရည်အသုံးပြုပုံ



- ❖ တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် မျှသာသောက်ရန် လိုအပ်သည်။
- ❖ ကျွမ်းကျင်သူမှ တစ်ဦးချင်းအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားသော ဆေးပမာဏအတိုင်း သောက်သုံးရန် လိုအပ်သည်။
- ❖ လူနာများအနေနှင့် မက်သာခုံးဆေးပေးခန်းသို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လာရောက်၍ သောက်သုံးရမည်။

၅။ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ

မက်သာခုံးအစားထိုးကုသပေးခြင်းအစီအစဉ်သည်


- ❖ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သုံးစွဲနေခြင်းမှ လျော့နည်းစေသည်။
- ❖ အထူးသဖြင့် HIV နှင့်အသဲရောင် B, C စသောသွေးမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါအန္တရာယ်များမှ လျော့ချပေးသည်။
- ❖ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
- ❖ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေသည်။
- ❖ လူမှုရေးအသိုင်းအဝန်းများနှင့် ဆက်ဆံရသော အခြေအနေများကို (အလုပ်နှင့် မိမိ၏ မိသားစုအတွင်းဆက်ဆံရေးတွင်) ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည်။
- ❖ မိမိဘဝ၏ အရည်အသွေးကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည်။

အထက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများသည် မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်စီအတွက်သာမက မိသားစုဝင်များနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝန်းအတွက်လည်း ဖြစ်သည်။



နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း (၂)

- ၁။ လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်
- မက်သာခုံးအစားထိုးကုသမှုသည် ရေရှည်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ ခု ရှိသည်။
- ❖ အစပျိုးကုသခြင်းအဆင့်ကို မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဌာန၊ ဆေးရုံများတွင် ကုခံယူခြင်းနှင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမည့် အဆင့်ကို ပြင်ပလူနာဌာနတွင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
 - ❖ အစပျိုးကုသခြင်းအဆင့်
 - အစိုးရ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဌာန၊ ဆေးရုံတွင် ကုသခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဌာနတွင် ရက်သတ္တပတ် (၂ မှ ၄ ပတ်) တက်ရောက်ကာ လူနာနှင့် သင့်လျော်သည့် ဆေးပမာဏ ရရှိသည်အထိ ဆေးရုံတက် ကုသရမည်။
 - ❖ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကုသခြင်း အစီအစဉ်
 - ထို့နောက်လူနာသည် သက်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဆေးရုံ၏ ပြင်ပလူနာဌာနသို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လာရောက်၍ ဆေးဝါး သောက်သုံးရန် လိုအပ်သည်။
 - ❖ ရေရှည်အစီအစဉ်ဖြစ်ခြင်း
 - မက်သာခုံးအစီအစဉ်၌ မည်မျှကြာမြင့်စွာ ရှိနေရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလမရှိပါ။
 - ❖ ဆေးပြန်သုံးစွဲလျှင်ဖြစ်သော အန္တရာယ်မြင့်မားမှုကြောင့် မက်သာခုံးဆေးကုသမှုကို အလျင်အမြန် ရပ်ဆိုင်းပစ်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။
- ၂။ အကျိုးသက်ရောက်မှု
- ❖ သင့်လျော်သော ဆေးပမာဏရရှိပါက ၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းမဲ သုံးစွဲလို စိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့ပါ။
 - ❖ မှန်ကန်သည့် ဆေးပမာဏကို သောက်သုံးလျှင် သာမန်ထက်လွန်ကဲသော စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲနာကျင့်မှု ဝေဒနာများကို ခံစားရခြင်းမျိုး မပေါ်ပေါက်စေပါ။ ယင်းထလာသည့် လက္ခဏာမျိုးကိုလည်း မပေါ်ပေါက်စေပါ။







January 2010

Երեքշաբթի Sunday	✓ 31	✓ 3	✓ 10	✓ 17	✓ 24
Թուրքի Monday		✓ 4	✓ 11	✓ 18	✓ 25
Երեք Tuesday		✓ 5	✓ 12	✓ 19	✓ 26
Չորեք Wednesday		✓ 6	✓ 13	✓ 20	✓ 27
Խոշոր Thursday		✓ 7	✓ 14	✓ 21	✓ 28
Հինգշաբթի Friday	✓ 1	✓ 8	✓ 15	✓ 22	✓ 29
Ուրբաթ Saturday	✓ 2	✓ 9	✓ 16	✓ 23	✓ 30

၃။ မက်သာဒုံး၏ အာနိသင်နှင့် ကောင်းကျိုးများ

- (၁) ခေါင်းမူးနောက်ရီဝေခြင်း
- (၂) ဝမ်းချုပ်ခြင်း
- (၃) ချွေးထွက်လွန်ခြင်း
- (၄) အာခေါင်ခြောက်ကပ်ခြင်းနှင့်
- (၅) ကာမဆန္ဒလျော့နည်းခြင်း
- (၆) အမျိုးသမီးများဓမ္မတာမမှန်ခြင်း



၁။ ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်များ

❖ မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲလျှင် အလွန်တရာ ဘေးကင်းသည့် ဆေးဖြစ်သည်။

အခြားသော မူးယစ်ထုံထိုင်းစေသည့် ဆေးဝါးများနှင့် အတူသုံးစွဲပါက ဆေးလွန်ကဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ဥပမာ - အရက်၊ ဒိုင်ယာစီပင်

ဆေးလွန်ကဲမှု လက္ခဏာများမှာ မက်သာဒုံးသောက်သုံးပြီး (၄) နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။

ဆေးလွန်ကဲမှုလက္ခဏာများမှ

(၁) သူငယ်အိမ်ကျဉ်းမြောင်းသွားခြင်း

(၂) စကားပြောရာတွင် မပီသတော့ခြင်း


(၃) လှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးလာခြင်း

(၄) နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးလာခြင်း

(၅) အသက်ရှူနှုန်းနှေးလာခြင်း

(၆) မေ့မြောခြင်း

(၇) အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း



နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း အကြံပေးခြင်း (၃)



၁။ မက်သာဒုံးဆေးရည် သောက်သုံးမှုအစီအစဉ်

- ❖ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း သတ်မှတ်ချိန် (ဥပမာ - နံနက် ၈ : ၀၀ မှ ၁၂ : ၀၀ နာရီအထိ) မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါ ကုဌာန၊ ပြင်ပလူနာဌာနသို့ လာရောက်၍ ဆေးဝါးသောက်သုံးရန် လိုအပ်သည်။
- ❖ အစပိုင်း၌ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဆရာဝန်မှ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ရမည်။
- ❖ ထို့နောက်တွင်လိုအပ်လျှင် ဆေးပမာဏအချိန်အဆကို ပြောင်းလဲပေးရမည်။
- ❖ ဆေးလာသောက်သုံးရန် (၂ ရက် ၄ ရက်) ပျက်ကွက်ခြင်းရှိပါက ဆေးလွန်ကဲခြင်း မဖြစ်အောင် လူနာ၏ အန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် ဆေးအချိန်အဆကို လျော့ချပေးရမည်။
- ❖ ၅ရက် ဆက်တိုက်(သို့) ထိုထက်ပို၍ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါမူ ဆေးကုသခြင်း အစီအစဉ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရမည်။ လူနာသည် နောက်ထပ် အစမှနေ၍ (အစပျိုးကုသခြင်းအဆင့်မှ) ပြန်စတင်ခြင်းဖြင့် အစီအစဉ်တွင် တဖန်ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်သည်။
- ❖ မက်သာဒုံးအစီအစဉ်တွင် ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
- ❖ မက်သာဒုံးအစီအစဉ်တွင် ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းများလည်း

ဆေးဝါးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း

ART နှင့် Anti TB ဆေးဝါးများ မက်သာဒုံး အာနိသင်ကို ကျဆင်းစေပါသည်။

မက်သာဒုံးနှင့် ၎င်းဆေးများကို တွဲဖက်သုံးစွဲပါက မက်သာဒုံးဆေးပမာဏကို လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲရပါမည်။ အကယ်၍ ယင်းထည့် လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရမည်။



၂။ ဖြစ်လာနိုင်သောအန္တရာယ်များ

ဆေးလွန်ကဲခြင်း

- ❖ မက်သာဒုံးဆေးသည်လည်း ဘိန်းဖြူကဲ့သို့ ဆေးလွန်ကဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- ❖ မက်သာဒုံးဆေးကို အရက်၊ ဒိုင်ဇိုဒိုင်ယာစီပင်နှင့် အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ တွဲဖက်သုံးစွဲမိပါက ဆေးလွန်ကဲမှုအန္တရာယ် ပိုများစေနိုင်သည်။
- ❖ မက်သာဒုံးဆေးသုံးစွဲမှုကို ရပ်တန့်ပြီး အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကို ပြန်လည်သုံးစွဲမည်ဆိုပါက ဆေးလွန်ကဲမှု ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများလာနိုင်ပါသည်။



၃။ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ

- ❖ အချိန်တိကျမှုရှိပါစေ၊ နောက်ကျခဲ့ပါက မက်သာခုံးဆေးရည် ၎င်းနေ့အဖို့ သောက်ရတော့မည် မဟုတ်ပါ။
- ❖ အရက်၊ ဘိန်းဖြူနှင့် ဒိုင်ယာဇီပင်ကဲ့သို့သော မူးယစ်စေသည့် ဆေးဝါးများကို သောက်သုံးပြီး မက်သာခုံးဆေးအား သောက်သုံးရန် မလာပါနှင့်။ ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးနှင့် မက်သာခုံးဆေးအား သောက်သုံးရန်လာရောက်ခဲ့သော် သင့်အားပေးထားသော ဆေးပမာ လျော့ချခြင်းခံရမည်။ သို့မဟုတ် ဆေးလုံးဝမပေး ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
- ❖ ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားလူနာများကို လေးစားမှုရှိပါ။ သူတစ်ပါးအား စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အပြုအမူ အပြောအဆိုများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ❖ ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ရုံးပိုင်ပစ္စည်းများကို လေးစားမှုရှိပါ။ သင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။ ၎င်းသည် သင်တို့ အတွက်သာဖြစ်သည်။
- ❖ မည်သည့်ရမ်းကား ကြမ်းတမ်းသည့် အပြုအမူကိုမှ သီးခံခွင့်လွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

