



ခြင်ကျားပေါက်ပွားပုံအဆင့်ဆင့်ဖြစ်သည့်  
(ခြင်ဥ→ပိုးလောက်လန်း→ပိုးရုပ်ဖုံး→သက်ကြီးကောင်)  
ဖြစ်စဉ်သည် (၈)ရက်မှ(၁၀)ရက်ခန့် အထိသာ  
ကြာမြင့်သည့်အတွက်  
ပေါက်ပွားမှုနှုန်းအလွန်မြန်ဆန်ပါသည်။  
ခြင်ကောင်ဖြစ်မှနှိမ်နင်းခြင်းထက်  
ပိုးလောက်လန်းဘဝတွင် နှိမ်နင်းခြင်းက  
ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။

# သွေးလွန်တုပ်ကွေးတိုက်ဖျက်ရေး အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေး




ကျောင်းသားအရွယ်ကလေးငယ်များ  
သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသည်ဟု  
သံသယရှိပါက နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွင်  
အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသ ကုသမှုခံယူပါ။

## “ခြင်ကျားလောကလန်းကင်းစင်ဖို့ တို့ကျောင်းသားတွေပါဝင်ဖို့။”

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ  
ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးစီမံချက်နှင့်  
ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲတို့  
ပူးပေါင်း ထုတ်ဝေသည်။ (ဇွန်လ၊ ၂၀၂၀)

**ပိုး**

အုတ်ကန်၊ ရေစည်၊ ရေထည့်သည့်ခွက်၊ ရေအိုးများကို ခြင်မဝင်နိုင်အောင် လုံခြုံစွာ **ဖုံး**အုပ်ပါ။



**ခစ်**

ရေရှားပါက ပိုးလောက်လန်း ရှိသောရေကို နောက်တစ်အိုးသို့ ရေစစ်ဖြင့် ပြောင်းထည့်ပါ။



**ထောင်**

ဘယ်အချိန်အိပ်အိပ်၊ ဘယ်နေရာအိပ်အိပ် ခြင်ထောင် **ထောင်**အိပ်ပါ။



**သွန်**

အုတ်ကန်၊ ရေစည်၊ ရေအိုးများ၏ အတွင်းပိုင်းကို တိုက်ချွတ်ဆေးကြော၍တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် **သွန်**ပစ်ပါ။



**အိုးအတွင်းပိုင်းတိုက်ချွတ်**

ရေစည်၊ ရေအိုးများ၊ ဘုရားပန်းအိုးများ၏ အတွင်းပိုင်းကို သေချာစွာတိုက်ချွတ် ဆေးကြောပါ။



**လောင်း**

ကြောင်အိမ်အောက်ခံခွက်များထဲသို့ ဆား၊ ဒီဇယ်၊ အင်ဂျင်ပိုင်အဟောင်းများ **လောင်း**ထည့်ပါ။

ဒီဇယ်



**အုတ်**

ဘုရားပန်းအိုး၊ အလှပန်းအိုးများကို တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် တိုက်ချွတ်ဆေးကြော ရေလဲပါ။



**ခတ်**

အုတ်ကန်ကြီးများ၊ ရေလှောင်ကန်ကြီးများကိုပိုးလောက်လန်း သေဆေး(Abate) **ခတ်**ပါ။

အဂီဝ



**ဖွင့်**

အလင်းရောင်ရ၍ ခြင်မရှိအောင် နိုင်ရန် နေ့ပိုင်း တွင်ပြတင်းပေါက်များ **ဖွင့်**ထားပါ။

